

لديك القدرة على إنقاذ حياة

يتوفر النالوكسون (NARCAN®) وشرائط
اختبار المخدرات في مقاطعة واين

كيفية إيقاف الجرعة الزائدة:

هزّ واصرخ

اتصل على الرقم 9-1-1

أعط النالوكسون (NARCAN®)

قشر:

قشر العبوة لإزالة رذاذ الأنف.
أمسك البخاخ بإبهامك على المكبس.

ضع:

ضع طرف رذاذ الأنف في أي من فتحتي الأنف
حتى تلمس أصابعك أنفه.

اضغط:

اضغط على المكبس بقوة
ليخرج الجرعة بأكملها في الأنف.

تأكد من إبقاء الفرد مستيقظاً ويتنفس
في حالة التنفس: ضع الشخص على جانبه لمنع الاختناق.

إذا لم يكن يتنفس: أجر التنفس الاصطناعي والانعاش القلبي
الرئوي إذا كنت مرتاحاً في فعل ذلك.

أعط النالوكسون (NARCAN®) مرة أخرى كل دقيقتين إذا لم يكن هناك استجابة

إذا لم يكن الفرد يتنفس، أعطه جرعات إضافية
من النالوكسون (NARCAN®) باستخدام رذاذ جديد كل دقيقتين،
مع التبديل في فتحات الأنف، حتى وصول المساعدة.



كيفية اكتشاف الجرعة الزائدة:

عدم التحرك، عدم
التمكن من إيقاظه

التنفس البطيء أو عدم التنفس
على الإطلاق - الشخير أو
الاختناق أو أصوات الفرغرة

تغيرات في لون الجلد
والشففتين والأظافر

الجلد بارد أو رطب



امسح للعثور على محطة العافية في
واين للحصول على النالوكسون (NARCAN®)
ومستلزمات اختبار المخدرات مجاناً.



EndOverdoseWayne.org

وزارة الصحة والخدمات الإنسانية
والمحاربين القدامى في مقاطعة واين

قد تكون معرفة علامات الجرعة
الزائدة وحمل النالوكسون (Narcan®)
القرار الأكثر أهمية الذي تتخذه.