

# TIENE LA CAPACIDAD DE SALVAR UNA VIDA

NALOXONE (NARCAN®) Y LA PRUEBAS  
DE DROGAS ESTÁN DISPONIBLES EN  
EL CONDADO DE WAYNE

## Cómo DETECTAR una sobredosis:



No moverse, no puede despertarse



Respiración lenta o nula,  
roncar, ahogarse o gorjeo



Cambios de color en la  
piel, los labios y uñas



Piel fría o húmeda



Escanee una estación de Well  
Wayne para obtener Naloxone  
(NARCAN®) y suministros de  
prueba de drogas.

**EndOverdoseWayne.org**

Departamento de Salud y Servicios Humanos y  
de Veteranos del Condado de Wayne

## Cómo DETENER una sobredosis:



**1** Sacuda y grite



**2** Llamar al 9-1-1



## Administre Naloxone (NARCAN®)

### Abrir:

Abra el envase para retirar el aerosol nasal.  
Sostenga el aerosol con los pulgares en el émbolo.

### Colocar:

Coloque la punta del aerosol nasal en cada narina  
hasta que sus dedos toquen la nariz.

### Presionar:

Presione el émbolo con firmeza para aplicar la dosis  
completa en la nariz.



## 4 Mantener despierto y respirando

**Si respira:** Acueste a la persona de costado para  
evitar que se ahogue.

**Si no respira:** Administre respiraciones de rescate  
y RCP, si se siente cómodo.



## 5 Administre Naloxone (NARCAN®) nuevamente cada 2 minutos si no responde

Si no respira, administre más dosis de Naloxone  
(NARCAN®) utilizando un nuevo envase cada 2 minutos,  
cambiando las narinas hasta que llegue la ayuda.

Conocer las señales de una sobredosis y  
llevar Naloxone (NARCAN®) podría ser la  
decisión más importante que puede tomar